

## ЗАДАЧИ И ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ - ТЕМА 2

**Задача 1.** Десетият и шестнадесетият член на аритметична прогресия са съответно равни на 14 и 26. Намерете третия член на прогресията.

*Решение.* Нека  $a_1$  и  $d$  са съответно първият член и разликата на аритметичната прогресия. От уравненията  $a_{10} = a_1 + 9d = 14$  и  $a_{16} = a_1 + 15d = 26$  намираме  $d = 2$ ,  $a_1 = -4$ . Тогава  $a_3 = a_1 + 2d = -4 + 4 = 0$ .

**Задача 2.** Решете неравенството  $3|x| \leq 2 + |x + 1|$ .

*Решение.* Даденото неравенство е еквивалентно на неравенствата:

$$1) -3x \leq 1 - x, \text{ ако } x < -1; \quad 2) -3x \leq 3 + x, \text{ ако } -1 \leq x < 0; \quad 3) 3x \leq 3 + x, \text{ ако } x \geq 0.$$

Решението на 1) е  $x \geq -1/2$ , което е несъвместимо с предположението  $x < -1$ ; решението на 2) е  $x \geq -3/4$ , което заедно с  $-1 \leq x < 0$  ни дава решение  $x \in [-3/4, 0)$ ; накрая, решението на 3) е  $x \leq 3/2$ , което заедно с предположението  $x \geq 0$  ни дава решение  $x \in [0, 3/2]$ . Окончателно, за решениета на даденото неравенство получаваме  $x \in [-3/4, 0) \cup [0, 3/2] = [-3/4, 3/2]$ .

**Задача 3.** Намерете всички решения на уравнението  $\sin x + \cos x = 1$ , които са в интервала  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

*Решение.* В интервала  $[0, \frac{\pi}{2}]$  функциите  $\sin x$  и  $\cos x$  приемат неотрицателни стойности, затова можем да повдигнем двете страни на даденото уравнение на квадрат, при което получаваме еквивалентното уравнение

$$2\sin x \cos x + \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \text{ т.e. } 1 + \sin 2x = 1,$$

или  $\sin 2x = 0$ . Тъй като  $2x$  принадлежи на интервала  $[0, \pi]$ , единствените решения на последното уравнение са  $x_1 = 0$  и  $x_2 = \frac{\pi}{2}$ . Това са и всичките решения на даденото уравнение в интервала  $[0, \frac{\pi}{2}]$ .

**Задача 4.** Лицето на околната повърхнина на правоъгълен паралелепипед е равно на 10, 16 или 18 в зависимост от това коя от стените му е избрана за основа. Намерете обема на паралелепипеда.


*Решение.* Да означим с  $a$ ,  $b$  и  $c$  дълчините на ръбовете, излизящи от един от върховете на паралелепипеда. От условието получаваме системата уравнения  $2a(b+c) = 10$ ,  $2b(a+c) = 16$ ,  $2c(a+b) = 18$ , или, еквивалентно,  $ab+ac = 5$ ,  $ab+bc = 8$  и  $ac+bc = 9$ . Събирайки почленно тези три уравнения, получаваме  $2(ab+bc+ca) = 22$ , или  $ab+bc+ca = 11$ . Чрез почленно изваждане от последното уравнение намираме  $bc = 6$ ,  $ca = 3$  и  $ab = 2$ . Умножавайки почленно последните три уравнения, намираме  $a^2b^2c^2 = 36$ , откъдето за обема  $V$  на паралелепипеда намираме  $V = abc = 6$ .

**Задача 5.** Точката  $M$  е във вътрешността или по контура на правоъгълник  $ABCD$  със страни  $AB = a$  и  $BC = b$ . Намерете възможно най-голямата стойност на сумата  $MA + MC$ .

*Решение.* Очевидно  $M$  не трябва да лежи върху диагонала  $AC$ , и можем да предположим, че  $M \in \Delta ACD$ . Ако  $M$  е вътрешна за  $\Delta ACD$ , нека  $N$  е пресечната точка на правата  $AM$  със страната  $CD$ . От неравенството  $MC < MN + NC$  получаваме  $AM + MC < AM + MN + NC = AN + NC$ , т.e.,  $AM + MC$  може да се увеличи, ако изберем  $M \equiv N$ . От друга страна, ако  $N \neq D$ , тогава от  $AN < AD + DN$  следва  $AN + NC < AD + DN + NC = AD + DC = b + a$ . Окончателно получаваме  $AM + MC \leq a + b$ , като равенството е изпълнено само при  $M \equiv D$  или при  $M \equiv B$ . Така възможно най-голямата стойност на  $MA + MC$  е  $a + b$ .

**Задача 6.** Около равнобедрен правоъгълен триъгълник  $ABC$  с прав ъгъл при върха  $C$  е описана окръжност. Върху дъгата  $\widehat{AB}$  от окръжността, която не съдържа точката  $C$ , е взета точка  $M$ . От точката  $C$  е спуснат перпендикуляр към правата  $AM$ , който пресича отсечката  $AM$  във вътрешна точка  $N$ . Докажете, че  $MN = AN + MB$ .

*Решение.* Да означим  $AC = BC = a$ ,  $AM = y$ ,  $MB = x$  и  $CM = z$ . От условието на задачата следва, че  $\angle ABC = \angle BAC = 45^\circ$ , а освен това имаме  $\angle AMC = \angle ABC$  и  $\angle BMC = \angle BAC$ , тъй като съответните двойки




ъгли се измерват с едни и същи дъги от окръжността. Отбелязваме, че  $\angle CAM$  е остър, защото в противен случай точката  $N$  няма да е вътрешна за отсечката  $AM$ . Като следствие,  $\angle BAM < 45^\circ$ , и  $y > x$ . От косинусовата теорема за  $\triangle AMC$  и  $\triangle BMC$  намираме  $y^2 + z^2 - 2yz \frac{\sqrt{2}}{2} = z^2 + x^2 - 2xz \frac{\sqrt{2}}{2} = a^2$ , откъдето получаваме  $x^2 - \sqrt{2}xz = y^2 - \sqrt{2}yz$ ,  $(x-y)(x+y) = \sqrt{2}z(x-y)$ , и понеже  $x \neq y$ ,

$$x + y = \sqrt{2}z.$$

Триъгълникът  $MNC$  е правоъгълен и равнобедрен, затова  $z = \sqrt{2}MN$ . Като заместим в горното равенство, получаваме  $x + y = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}MN = 2MN$ , т.e.,  $MB + AN + NM = 2NM$ , откъдето следва  $MB + AN = MN$ .

**Задача 7.** Две окръжности с радиуси 4 и 1 се допират външно в точка  $M$ , а общата им външна допирателна се допира до тях в точки  $A$  и  $B$ . Намерете лицето на триъгълника  $AMB$ .


*Решение.* Нека  $O_1$  и  $O_2$  са центровете на двете окръжности с радиуси съответно 4 и 1, а  $P$  е петата на перпендикуляра, спуснат от  $M$  към  $AB$ . През точката  $O_2$  прекарваме права, успоредна на  $AB$ , която пресича отсечките  $MP$  и  $O_1A$



съответно в точките  $N$  и  $Q$ . Триъгълникът  $O_1O_2Q$  е правоъгълен с катет  $O_1Q = 4 - 1 = 3$  и хипотенуза  $O_1O_2 = 4 + 1 = 5$ , и от Питагоровата теорема намираме  $O_2Q = 4$ . Тъй като  $QO_2BA$  е правоъгълник, следва, че  $AB = 4$ . Триъгълниците  $NMO_2$  и  $QO_1O_2$  са подобни, затова  $\frac{MN}{O_1Q} = \frac{MN}{3} = \frac{O_2M}{O_2O_1} = \frac{1}{5}$ , откъдето намираме  $MN = \frac{3}{5}$ . Следователно за височината към страната  $AB$  в  $\Delta AMB$  получаваме  $MP = MN + NP = \frac{3}{5} + 1 = \frac{8}{5}$ . Лицето  $S$  на  $\Delta AMB$  намираме от  $S = \frac{1}{2}AB \cdot MP = \frac{16}{5}$ .

**Задача 8.** В триъгълна пирамида  $ABCD$  ръбовете  $AD$ ,  $BD$  и  $CD$  имат равни дължини и са два по два взаимно перпендикуляри. Радиусът на описаната около пирамидата сфера е  $R$ . Намерете обема на пирамидата.

*Решение.* Да означим с  $\ell$  дължината на околните ръбове  $DA$ ,  $DB$  и  $DC$  на пирамидата, тогава основата ѝ  $ABC$  е равностранен триъгълник с дължина на страната  $\ell\sqrt{2}$ . Нека  $H$  е ортогоналната проекция на върха  $D$  върху основата  $ABC$ , тогава  $H$  е центърът на описаната около  $\Delta ABC$  окръжност, а радиусът ѝ е  $AH = \sqrt{2}\ell \frac{\sqrt{3}}{3} = \ell \frac{\sqrt{6}}{3}$ . Центърът на описаната около пирамидата сфера лежи върху правата  $DH$ , и нека



означим с  $M$  другия край на диаметъра на сферата, който минава през точката  $D$ . Триъгълникът  $AMD$  е вписан в окръжност с диаметър  $AM = 2R$ , следователно е правоъгълен с прав ъгъл при върха  $A$ , и  $AH$  е височина към хипотенузата му  $DM$ . От Питагорова теорема за правоъгълния триъгълник  $AHD$  намираме  $DH = \sqrt{AD^2 - AH^2} = \ell \frac{\sqrt{3}}{3}$ . От формулата  $AD^2 = DH \cdot DM$  за правоъгълния триъгълник  $DAM$  получаваме  $\ell^2 = \ell \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot 2R$ , и от тук  $\ell = \frac{2}{\sqrt{3}}R$ . Тъй като околните ръбове  $DA$ ,  $DB$  и  $DC$  са два по два взаимно перпендикуляри,  $AD$  е височина към стената  $BCD$  на пирамидата  $ABCD$ , и за обема ѝ  $V$  намираме  $V = \frac{1}{3}S_{BCD} \cdot AD = \frac{1}{3} \cdot \frac{BD \cdot CD}{2} \cdot AD = \frac{1}{6} \ell^3 = \frac{4\sqrt{3}}{27} R^3$ .


**Задача 9.** Група от  $n$  деца си разделили кутия бонбони. Първото дете взело 1 бонбон и още една десета от останалите в кутията бонбони. След него второто взело 2 бонбона и още една десета от останалите след това бонбони в кутията, и т.н., предпоследното дете взело  $n - 1$  бонбона и още една десета от останалите след това бонбони в кутията. За последното дете в кутията останали  $n$  бонбона. Намерете броя  $n$  на децата, ако е известно, че първите две деца са взели по равен брой бонбони.

*Решение.* Нека  $s$  е първоначалният брой на бонбоните в кутията, тогава първото дете е взело  $1 + (s - 1)/10$  бонбона, а второто е взело  $2 + (s - 3 - (s - 1)/10)/10$  бонбона. По условие, те са взели равен брой бонбони, и от приравняването на двата израза получаваме  $s = 81$ . От тук намираме, че първите две деца са взели по 9 бонбона. Ще докажем чрез индукция, че всяко от първите  $n - 1$  деца е взело 9 бонбона. Това е вярно за първите две деца, и нека допуснем, че първите  $m$  деца ( $2 \leq m < n - 1$ ) са взели по 9 бонбона, тогава съгласно условието,  $(m + 1)$ -вото дете е взело  $m + 1 + (81 - 9m - (m + 1))/10 = 9$  бонбона. Следователно първите  $n - 1$  деца са взели по 9 бонбона, или общо  $9(n - 1)$  бонбона, които добавени към  $n$ -те бонбона, взети от последното дете, правят 81 бонбона, т.е.,  $9(n - 1) + n = 81$ . От тук намираме  $n = 9$ .

**Задача 10.** В триъгълника  $ABC$  са взети точка  $P$  върху страната  $AC$  и точка  $Q$  върху страната  $AB$ , такива че  $PC + QB = BC$ . През точките  $P$  и  $Q$  е прекарана окръжност, която се допира до страната  $BC$  в точка  $M$  и  $\angle QMP = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC$ . Намерете дълчината на  $CM$ , ако  $PC = 2$ .

*Решение.* Да означим с  $\alpha$ ,  $\beta$  и  $\gamma$  ъглите на  $\Delta ABC$  съответно при върховете  $A$ ,  $B$  и  $C$ . Нека точката  $M_1$  върху страната  $BC$  е такава, че  $BM_1 = BQ$  и  $CM_1 = CP$ . Тогава триъгълниците  $PCM_1$  и  $QBM_1$  са равнобедрени, и

$$\angle PM_1Q = 180^\circ - \angle CM_1P - \angle BM_1Q = 180^\circ - \frac{180^\circ - \gamma}{2} - \frac{180^\circ - \beta}{2} = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}.$$



Но по условие  $\angle PMQ = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$ , и понеже  $M$  е допирната точка на окръжността до страната  $BC$ , равенството  $\angle PM_1Q = \angle PMQ$  ще бъде изпълнено само ако  $M_1 \equiv M$  (в противен случай точката  $M_1$  е външна за окръжността, и тогава  $\angle PM_1Q < \angle PMQ$ ). Следователно  $CM = CP = 2$ .

*Пълното решение на всяка задача се оценява с 4 точки. Оценката се получава по формулата  $2 + 0,1N$ , където  $N$  е броят на получените точки.*