




## ЗАДАЧИ И ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ – ТЕМА 2

**Задача 1.** Петият и деветнадесетият член на аритметична прогресия са съответно равни на 9 и 37. Да се намери сборът на първите 29 члена.

*Решение:* Нека  $a_1$  и  $d$  са първият член и разликата на прогресията. От  $a_5 = a_1 + 4d = 9$  и

$$a_{19} = a_1 + 18d = 37 \text{ намираме } a_1 = 1 \text{ и } d = 2. \text{ Тогава } S_{29} = \frac{2a_1 + 28d}{2} \cdot 29 = 841$$



**Задача 2.** Даден е правоъгълен триъгълник  $ABC$  ( $\angle ACB = 90^\circ$ ) с медиана  $CM = \frac{5}{2}$  и височина  $CH = \frac{12}{5}$ . Да се намерят дължините на катетите на триъгълника.

*Решение:* Тъй като  $AB = 2CM = 5$ , то  $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot CH = 6$ . От друга страна,  $AC \cdot BC = 2S_{ABC} = 12$  и  $AC^2 + BC^2 = AB^2 = 25$ . Оттук намираме  $AC = 3$ ,  $BC = 4$  или  $AC = 4$ ,  $BC = 3$ .


**Задача 3.** Да се реши уравнението  $(2^{4x^2-1} - 5)^2 = 9$ .

*Решение:* Уравнението е еквивалентно на  $2^{4x^2-1} = 8$  или  $2^{4x^2-1} = 2$ . Оттук  $4x^2 - 1 = 3$  или  $4x^2 - 1 = 1$ .

Следователно корените на уравнението са,  $x_{1,2} = \pm 1$ ;  $x_{3,4} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Задача 4.** Даден е трапец  $ABCD$  ( $AB \parallel CD$ ,  $AB > CD$ ) с лице 6, бедра  $AD = 2$ ,  $BC = 4$  и ъгъл между бедрата  $60^\circ$ . Да се намерят основите на трапеца.

*Решение:* Нека  $AB = a$ ,  $CD = b$  и  $CP \perp AD$ . Тогава  $CP = AD$ ,  $\angle BCP = 60^\circ$  и  $PB = a - b$ . От  $\Delta BCP$  намираме  $PB^2 = PC^2 + BC^2 - 2PC \cdot BC \cos 60^\circ = 3$ , т.e.  $a - b = 2\sqrt{3}$  (1). Ако  $CH \perp AB$ , за  $\Delta BCP$  имаме  $2S_{BCP} = CH \cdot PB = CP \cdot BC \sin 60^\circ = 4\sqrt{3}$ , откъдето  $CH = 2$ . От  $S_{ABCD} = \frac{a+b}{2} \cdot 2 = 6$  получаваме  $a + b = 6$  (2). От (1) и (2):  $a = 3 + \sqrt{3}$ ,  $b = 3 - \sqrt{3}$ .



**Задача 5.** Да се реши неравенството  $\log_3 \frac{x-1}{x-3} - 2 \log_3 \frac{1-x}{x-5} < 0$ .

*Решение:* Множеството от допустимите стойности е  $(3; 5)$ . Даденото неравенството е

еквивалентно на  $\frac{3x-11}{(x-1)(x-3)} > 0 \Leftrightarrow (x-1)(x-3)(3x-11) > 0$ , откъдето  $x \in (1; 3) \cup \left(\frac{11}{3}; +\infty\right)$ . Като


вземем предвид множеството от допустимите стойности, намираме, че  $x \in \left(\frac{11}{3}; 5\right)$ .

**Задача 6.** В триъгълника  $ABC$  вътрешната ъглополовяща през върха  $C$  пресича страната  $AB$  в точка  $L$ . Ако  $AL = 5$  и  $BL = 3$ , да се намери радиусът на окръжността, минаваща през точките  $C$  и  $L$ , с център върху правата  $AB$ .

*Решение:* Нека  $O$  и  $R$  са центърът и радиусът на  $k$ . Тъй като  $CL$  е хорда в  $k$ , то  $MO \perp CL$ . Ако  $CK$  е външната ъглополовяща през върха  $C$ ,  $CK \perp CL$  и  $MO$  е средна отсечка в  $\Delta CLK$ . Тогава  $LK = 2R$ .

От свойствата на ъглополовящата имаме  $\frac{KA}{KB} = \frac{LA}{LB} = \frac{AC}{BC} = \frac{5}{3}$ .

Но  $KA = KB + AB = KB + 8$ , откъдето  $KB = 12$ ,  $LK = 15$  и  $R = 7,5$ .



**Задача 7.** Да се намерят стойностите на параметъра  $a$ , при които уравнението  $\sqrt{x-3} + ax = 2a + 3$  има единствено решение.

*Решение:* При  $x \geq 3$  полагаме  $t = \sqrt{x-3} \geq 0$  и получаваме  $at^2 + t + a - 3 = 0$  (1). Тогава (1) трябва да има точно един неотрицателен корен. При  $a = 0$  получаваме  $t = 3$ . Нека  $a \neq 0$ . Разглеждаме дискриминантата  $D = 1 - 4a^2 + 12a$ .  $D = 0$  за  $a_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{10}}{2}$ . При  $a = \frac{3-\sqrt{10}}{2}$  (1) има единствен положителен корен, а при  $a = \frac{3+\sqrt{10}}{2}$  – единствен отрицателен корен. Нека  $\frac{3-\sqrt{10}}{2} < a < \frac{3+\sqrt{10}}{2}$  и  $a \neq 0$ . Уравнението

(1) ще има един положителен и един отрицателен корен, когато  $a(a-3) < 0$ , т.е.  $0 < a < 3$ , а при  $a = 3$  корените са  $t_1 = 0$  и  $t_2 = -3$ . Окончателно решението на задачата е  $a \in \left\{ \frac{3-\sqrt{10}}{2} \right\} \cup [0; 3]$

**Задача 8.** Спрямо правоъгълна координатна система  $Oxy$  са дадени точките  $A(-2; 7)$ ,  $B(-1; 3)$  и  $D(3; 7)$ . Върховете на четириъгълника  $ABCD$  с диагонали  $AC$  и  $BD$  лежат върху графиката на функцията  $f(x) = ax^2 + bx + c$ . Да се намерят координатите на върха  $C$ , при които лицето на  $ABCD$  е най-голямо, и да се пресметне това лице.

*Решение:* Тъй като  $A, B$  и  $D$  лежат върху графиката на функцията  $f(x)$ , то:  $f(-2) = 7$ ;  $f(-1) = 3$ ;  $f(3) = 7$ , откъдето:  $a = 1, b = -1, c = 1$ .

Следователно  $f(x) = x^2 - x + 1$ . Ако  $B_1(-1; 0), D_1(3; 0)$  и  $C_1(x; 0)$  са проекциите на  $B, C, D$  върху  $Ox$ , то  $x \in (-1; 3)$ , защото  $AC$  и  $BD$  са диагонали. Понеже  $S_{ABD} = 10$ , лицето на  $ABCD$  е най-голямо, когато  $S_{BCD} = S(x)$  е най-голямо.

Но  $S(x) = S_{BB_1D_1D} - S_{BB_1C_1C} - S_{CC_1D_1D} = \frac{1}{2}(40 - (3 + f(x))(x + 1) - (7 + f(x))(3 - x)) = -2x^2 + 4x + 6$ . Тъй като  $S(x)$  има локален максимум при  $x_0 = 1$  в интервала  $(-1; 3)$ , то  $\max S(x) = S(1) = 8$ . Следователно за точката  $C_0(1, 1)$   $S_{ABCD}$  е най-голямо и  $S_{ABC_0D} = S_{ABD} + S_{BC_0D} = 10 + 8 = 18$ .

**Задача 9.** Дадена е правилна четириъгълна пирамида  $QABCD$  с връх  $Q$ . Ъгълът между околния ръб  $CQ$  и равнината  $BDQ$  е  $30^\circ$ . През върха  $A$  е построена равнина  $\alpha$ , перпендикулярна на ръба  $CQ$ . Да се намери тангенсът на ъгъла между равнината  $\alpha$  и равнината  $QAB$ .

*Решение:* Нека  $\alpha \cap CQ = P$ ,  $\alpha \cap BQ = M$ ,  $\alpha \cap DQ = N$  и  $AC \cap BD = H$ . Тъй като пирамидата е правилна, то  $QH \perp (ABCD)$  и  $CH \perp (BDQ)$ . Тогава  $QH$  е ортогоналната проекция на  $QC$  в равнината  $(BDQ)$  и  $\angle [CQ, (BDQ)] = \angle CQH = 30^\circ$ . Но  $\Delta CQA$  е равнобедрен,  $QH \perp AC$ , така че  $\angle CQA = 60^\circ$ , т.е.  $AQ = CQ = AC = 2a$ . Понеже  $QC \perp MN$ , то  $MN \perp BD$ . Също така, от  $AP \perp BD$  следва, че  $MN \perp AP$ . Тъй като  $\alpha \cap (ABQ) = AM$ , ако  $PR \perp AM$ , то  $\angle [\alpha, (ABQ)] = \angle PRQ = \varphi$ . Тогава  $\tan \varphi = \frac{PQ}{PR}$ . От  $AP \perp QC$  следва, че  $PQ = a$  и  $AP = a\sqrt{3}$ . Ако  $AP \cap HQ = O$ , то  $MN \cap HQ = O$ . Тъй като  $\frac{OO}{QH} = \frac{AO}{AP} = \frac{2}{3}$ , то  $MN = \frac{2}{3}BD = \frac{2}{3}AC$ . Тогава  $\Delta AMN$  е равностранен и  $\angle OAM = \angle PAR = 30^\circ$ . От  $\Delta APR$  намираме  $PR = \frac{1}{2}AP = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ . Следователно  $\tan \varphi = \frac{PQ}{PR} = \frac{2}{\sqrt{3}}$ .

**Задача 10.** Дадена е функцията  $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$ ,  $x > 1$ . Нека спрямо правоъгълна координатна система  $Oxy$  точка  $A$  има координати  $(2a; 0)$ , където  $a$  е реален параметър, а точка  $B$  лежи на графиката на  $f(x)$  и е такава, че  $\Delta OAB$  е равнобедрен ( $OB = AB$ ). Да се докаже, че съществува единствена окръжност  $k$ , която се допира до оста  $Ox$  в точка  $O$  и до всички преви  $AB$ . Да се намери радиусът на тази окръжност.

*Решение:* Понеже  $\Delta OAB$  е равнобедрен, то  $B(a; f(a))$  и  $a > 1$ . Ако  $C$  е центърът на  $k$ , то  $C$  е пресечната точка на ъглополовящата на  $\angle OAB = \alpha$  и оста  $Oy$ . Тогава радиусът на  $k$  е  $R = OC$  и от  $\Delta OAC$  имаме  $\frac{R}{2a} = \frac{OC}{OA} = \tan \frac{\alpha}{2}$ . От  $\Delta OAB$  намираме  $\tan \alpha = \frac{f(a)}{a} = \frac{2a}{a^2 - 1}$ . Оттук

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{a}$$
 или  $\tan \frac{\alpha}{2} = -a$ . Но  $\frac{\alpha}{2} < 90^\circ$ , така че  $\frac{R}{2a} = \frac{1}{a}$ , т.е.  $R = 2$ .

*Пълното решение на всяка задача се оценява с 4 точки. Оценката се получава по формулата  $2 + 0,1N$ , където  $N$  е броят на получените точки.*

