

**Задача 11.1.** Да се реши неравенството

$$2^{2ax+1} + 2^a \leq 2^{ax} + 2^{ax+a+1},$$

където  $a$  е реален параметър.

**Решение.** След полагане  $2^{ax} = y > 0$ , получаваме неравенството

$$2y^2 - (2^{a+1} + 1)y + 2^a \leq 0$$

с решение  $y \in [\frac{1}{2}; 2^a]$  при  $a \geq -1$  и  $y \in [2^a; \frac{1}{2}]$  при  $a < -1$ .

Следователно:

1. При  $a < -1$  имаме  $2^a \leq 2^{ax} \leq 2^{-1}$ , т.e.  $a \leq ax \leq -1$ , откъдето  $1 \geq x \geq -\frac{1}{a}$ .
2. При  $a = -1$  имаме  $2^{-x} = 2^{-1}$ , т.e.  $x = 1$ .
3. При  $-1 < a < 0$  имаме  $2^{-1} \leq 2^{ax} \leq 2^a$ , т.e.  $-1 \leq ax \leq a$ , откъдето  $-\frac{1}{a} \geq x \geq 1$ .
4. При  $a = 0$  всяко  $x$  е решение.
5. При  $a > 0$  имаме  $2^{-1} \leq 2^{ax} \leq 2^a$ , т.e.  $-1 \leq ax \leq a$ , откъдето  $-\frac{1}{a} \leq x \leq 1$ .

**Оценяване.** 1 т. за полагането; 1 т. за намиране на корените на съответното квадратно уравнение; 1 т. за определяне на решенията на неравенството в зависимост от  $a$ ; 4 т. за довършване на решението.

**Задача 11.2.** Нека  $a_1 > 1$  и  $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n} - 1$  при  $n \geq 1$ . Да се докаже, че:

- а) редицата  $(a_n)$  е сходяща и да се намери нейната граница;
- б) съществува  $n$ , за което  $a_{2n} < 1 + \frac{1}{2^{2n}}$ .

**Решение.** а) Понеже  $a_{n+1} - 1 = \frac{(a_n - 1)^2}{a_n} > 0$ , то  $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_n} - 1 < 0$  и значи  $a_n > a_{n+1} > 1$ . Следователно редицата е сходяща и за нейната граница  $l$  имаме, че  $l = l + \frac{1}{l} - 1$ , т.e.  $l = 1$ .

- б) От а) следва, че  $a_k \leq 3/2$  за някое  $k$ . Тогава от

$$a_{n+1} - 1 = \frac{(a_n - 1)^2}{a_n} < (a_n - 1)^2$$

по индукция получаваме, че  $a_n - 1 < \frac{1}{2^{2n-k}}$  при  $n > k$ . Остава да изберем  $n \geq 2k$ .

**Оценяване.** а) по 1 т. за  $a_{n+1} > 1$ ,  $a_n > a_{n+1}$  и  $l = 1$ ; б) 1 т. за  $a_{n+1} - 1 < (a_{n+1} - 1)^2$ , 1 т.  $a_n < (a_{n-k} - 1)^{2^{2n-k}}$  и 2 т. за довършване на решението.

**Задача 11.3.** Дени попълва с ненулево цяло число някой от коефициентите на уравнение от 2010-та степен, след това Вени попълва също с ненулево цяло число друг

от коефициентите и т.н., докато бъдат попълнени всичките 2011 коефициента. Дени печели, ако полученото уравнение има целочислен корен, а в противен случай печели Вени. Коя от двете има печеливша стратегия?

**Решение.** Дени може да попълва така, че след всяко нейно попълване (без предпоследното) броят на непопълнените коефициенти пред нечетните и пред четните степени да е един и същ. Значи преди предпоследния ѝ ход има само един непопълнен коефициент от едната група, например групата  $A$ . Тя го попълва така, че сумата на числата в  $A$  да стане ненулева. С последното си попълване Дени може да направи така, че полученото уравнение да има корен 1 или  $-1$ . Наистина, в противен случай сумата от всички коефициенти без последния, който трябва да се попълни, например  $b$ , би била 0 (това означава, че 1 не може да е корен на уравнението). Също така, разликата на сумите от числата в  $A$  и числата в другата група  $B$  без самото  $b$  също би била 0 (понеже  $-1$  не е корен на уравнението съгласно допускането). Оттук следва, че както сумата на числата в  $B \setminus \{b\}$ , така и тази на числата в  $A$  е 0. Последното вече е противоречие.

**Оценяване.** 3 т. за стратегията три хода преди края да има само един непопълнен коефициент от едната група и 4 т. за довършване на решението; 1 т. само за твърдение, че има стратегия, при която 1 или  $-1$  е корен на полученото уравнение.

**Задача 11.4.** Даден е остроъгълен триъгълник  $ABC$  за който  $\cos \angle BAC = \frac{1}{3}$ . Правата през  $A$ , успоредна на медианата  $BM$ ,  $M \in AC$  пресича продължението на височината  $CC_1$ ,  $C_1 \in AB$  в точка  $D$ . Ако  $CC_1 : C_1D = 2 : 1$ , да се намери отношението  $\frac{R}{r}$  където  $R$  и  $r$  са съответно радиусите на описаната и вписаната окръжност за  $\triangle ABC$ .

**Решение.** Да означим с  $N$  пресечната точка на  $BM$  и  $CC_1$ . Тъй като  $MN$  е успоредна на  $AD$  и  $M$  е среда на  $AC$ , то  $MN$  е средна отсечка в  $\triangle ADC$ . Следователно  $N$  е среда на  $CD$  и като използваме, че  $CC_1 : C_1D = 2 : 1$ , лесно получаваме  $CN : NC_1 : C_1D = 3 : 1 : 2$ .

Ако  $AC = 2t$ , то  $AC_1 = AC \cos \angle BAC = \frac{2t}{3}$  и от подобието на  $\triangle ADC_1$  и  $BNC_1$  намираме  $\frac{AC_1}{BC_1} = \frac{DC_1}{NC_1} = 2$ , т.e.  $BC_1 = \frac{t}{3}$ . Сега от косинусовата теорема пресмятаме

$$BC = \sqrt{t^2 + 4t^2 - 4t^2 \frac{1}{3}} = t\sqrt{\frac{11}{3}}.$$

Тъй като  $\sin \angle BAC = \sqrt{1 - \cos^2 \angle BAC} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ , то  $R = \frac{BC}{2 \sin \angle BAC} = \frac{t\sqrt{66}}{8}$ .

От формулата  $r(AB + BC + CA) = AB \cdot AC \sin \angle BAC$  намираме  $r = \frac{4t\sqrt{2}}{9 + \sqrt{33}}$  и следователно

$$\frac{R}{r} = \frac{9\sqrt{33} + 33}{32}.$$

**Оценяване.** 1 т. за намиране на отношението  $CN : NC_1 : C_1D = 3 : 1 : 2$ ; 1 т. за намиране на  $AC = 2AB$ ; 1 т. за пресмятане на  $BC$ ; 1 т. за пресмятане на  $\sin \angle BAC$ ; по 1 т. за пресмятане на  $R$  и  $r$ ; 1 т. за довършване на решението.

**Задача 11.5.** Клетките на таблица с 2009 реда и 2011 стълба са оцветени шахматно. Да се намери най-голямото естествено число  $k$  със следното свойство. При изтриване на произволни  $k$  клетки на таблицата, така че измежду неизтритите клетки има равен брой бели и черни, останалата част от таблицата (т.е. неизтритите клетки) може да се покрие с домина. (Доминото се състои от две клетки с обща страна).

**Решение.** Ще докажем, че за всяка таблица с нечетни страни търсеното число е  $k = 3$ . Без ограничение можем да считаме, че четирите ъглови клетки са черни. Ясно е, че  $k$  трябва да е нечетно число и ако  $k \geq 5$  то трябва да изтрием поне 2 бели и 3 черни клетки. Ако изтрием двете бели съседни клетки на коя да е ъглова, то тази ъглова клетка остава изолирана и не може да се покрие от домино. Следователно  $k \leq 3$ .

Остава да докажем, че както и да изтрием 2 черни и една бяла клетка останалата част от дъската може да се покрие с домина. За дъска  $3 \times 3$  това се проверява директно. Сега да разгледаме дъска  $2p + 1 \times 2q + 1$ , за която поне едно от  $p$  и  $q$  е по-голямо от 1 и от която сме изтрили 2 черни и една бяла клетка. Без ограничение  $q > 1$  и да разгледаме двете ивици, съставени от първите два и от последните два стълба. Ако в някой от тях няма изтрита клетка, твърдението следва по индукция. Ако и в двете има изтрита клетка, то в едната ивица има само една изтрита клетка. Без ограничение нека това е ивицата от първите два стълба. Ако изтритата клетка е в първия стълб, то поставяме хоризонтални домина в тази ивица, като само доминото в реда на изтритата клетка ще покрива клетка със същия цвят от останалата част на таблицата. Ако изтритата клетка е във втория стълб, използваме едно вертикално домино и едно хоризонтално домино, като отново покриваме една клетка със същия цвят от останалата част от таблицата. И в двета случая твърдението следва по индукция.

**Оценяване.** 1 т. за посочване на отговора; 1 т. за започване на доказателство с индукция или друг подход; 5 т. за вярна индукция или довършване на решението по друг начин.

**Задача 11.6.** Нека  $f(x)$  е полином с цели кофициенти и  $n$  е дадено естествено

число. Известно е, че за всеки две цели числа  $a$  и  $b$ , за които  $a - b$  се дели на  $n$ , числата  $f(a)$  и  $f(b)$  не са взаимно прости. Да се докаже, че съществува просто число  $p$ , за което  $p$  дели  $f(x)$  за всяко цяло число  $x$ .

**Решение.** Да допуснем, че просто число със свойството от условието не съществува. Първо ще докажем, че за произволни прости числа  $p_1, p_2, \dots, p_k$  съществува цяло число  $b$ , за което  $f(b)$  не се дели на  $p_i$  за всяко  $i = 1, 2, \dots, k$ .

Наистина, от допускането следва, че за всяко  $i = 1, 2, \dots, k$  съществува  $x_i$ , за което  $f(x_i)$  не се дели на  $p_i$ . Според китайската теорема за остатъците съществува число  $b \equiv x_i \pmod{p_i}$  и тогава  $f(b) \equiv f(x_i) \not\equiv 0 \pmod{p_i}$ .

Нека  $p_1, p_2, \dots, p_k$  са простите делители на  $n$ . Според доказаното свойство съществува число  $b$ , за което  $f(b)$  не се дели на  $p_i$  за всяко  $i = 1, 2, \dots, k$ . Нека  $q_1, q_2, \dots, q_l$  са простите делители на  $f(b)$ . Отново от доказаното свойство следва, че съществува  $c$  за което  $f(c)$  не се дели на никое от числата  $q_1, q_2, \dots, q_l$ . Тъй като  $q_1 q_2 \dots q_l$  е взаимно просто с  $n$ , то сравнението  $q_1 q_2 \dots q_l x \equiv b - c \pmod{n}$  има решение. Тогава, ако  $a = q_1 q_2 \dots q_l x + c$ , то  $a \equiv b \pmod{n}$  и  $f(a) \equiv f(c) \not\equiv 0 \pmod{q_i}$  за всяко  $i = 1, 2, \dots, l$ . Това означава, че  $f(a)$  и  $f(b)$  са взаимно прости, което е противоречие с условието.

Следователно съществува просто число  $p$ , за което  $p$  дели  $f(x)$  за всяко цяло число  $x$ .

**Оценяване.** 3 т. за доказване, че за произволни прости числа  $p_1, p_2, \dots, p_k$  съществува цяло число  $b$ , за което  $f(b)$  не се дели на  $p_i$  за всяко  $i = 1, 2, \dots, k$ ; 3 т. за намиране на числото  $c$  от решението; 1 т. за довършване на решението.

*Задачите са предложени от:* Емил Колев – 11.1, 11.4, 11.5, Николай Николов – 11.2, 11.3, Александър Иванов – 11.6.