

РЕШЕНИЯ

ТЕМА ЗА 8 КЛАС

Задача 1. Да се реши системата:

$$\begin{cases} |x| + |y| = 1 \\ |x - 2a| = |y - 3| \end{cases}$$

в зависимост от реалния параметър a .

Решение: От второто уравнение имаме: $x - 2a = y - 3$ или $-x + 2a = y - 3$. В първия случай $y = x - 2a + 3$ и първото уравнение добива вида $|x| + |x - 2a + 3| = 1$.

Ако $x \geq 0$ и $x \geq 2a - 3$, имаме $2x - 2a + 3 = 1$, откъдето $x = a - 1$. Получената стойност е решение при $a \geq 1$ и $a - 1 \geq 2a - 3$, т.е. ако a се намира в интервала $[1; 2]$. Сега $y = a - 1 - 2a + 3 = 2 - a$.

Ако $x \geq 0$ и $x < 2a - 3$, имаме $0x + 2a - 3 = 1$, откъдето $0x = 2a - 4$, което има решения само при $a = 2$ и тогава x може да е всяко число в интервала $[0; 1)$. Съответно $y = x - 1$.

Ако $x < 0$ и $x \geq 2a - 3$, имаме $0x - 2a + 3 = 1$, откъдето $0x = 2a - 2$, което има решения само при $a = 1$ и тогава x може да е всяко число в интервала $[-1; 0)$. Съответно $y = x + 1$.

Ако $x < 0$ и $x < 2a - 3$, имаме $2x - 2a + 3 = -1$, откъдето $x = a - 2$. Получената стойност е решение при $a < 2$ и $a - 2 < 2a - 3$, т.е. ако a се намира в интервала $(1; 2)$. Сега $y = a - 2 - 2a + 3 = 1 - a$.

Във втория случай $y = -x + 2a + 3$ и първото уравнение от системата добива вида $|x| + |x - 2a - 3| = 1$.

Ако $x \geq 0$ и $x \geq 2a + 3$, имаме $2x - 2a - 3 = 1$, откъдето $x = a + 2$. Получената стойност е решение при $a \geq -2$ и $a + 2 \geq 2a + 3$, т.е. ако a се намира в интервала $[-2; -1]$. Съответно $y = -a - 2 + 2a + 3 = a + 1$.

Ако $x \geq 0$ и $x < 2a + 3$, имаме $0x + 2a + 3 = 1$, откъдето $0x = 2a + 2$, което има решения само при $a = -1$ и тогава x може да е всяко число в интервала $[0; 1)$. Съответно $y = 1 - x$.

Ако $x < 0$ и $x \geq 2a + 3$, имаме $0x - 2a - 3 = 1$, откъдето $0x = 2a + 4$, което има решения само при $a = -2$ и тогава x може да е всяко число в интервала $[-1; 0)$. Съответно $y = -x - 1$.

Ако $x < 0$ и $x < 2a + 3$, имаме $2x - 2a - 3 = -1$, откъдето $x = a + 1$. Получената стойност е решение при $a < -1$ и $a + 1 < 2a + 3$, т.е. ако a се намира в интервала $(-2; -1)$. Сега $y = -a - 1 + 2a + 3 = a + 2$.

Като подредим според стойностите на параметъра a , получаваме следното:

Ако $a = -2$, то x може да е всяко число в интервала $[-1; 0]$ и $y = -x - 1$.

Ако $-2 < a < -1$, то $(x; y) = (a + 2; a + 1)$ или $(x; y) = (a + 1; a + 2)$.

Ако $a = -1$, то x може да е всяко число в интервала $[0; 1]$ и $y = 1 - x$.

Ако $a = 1$, то x може да е всяко число в интервала $[-1; 0]$ и $y = x + 1$.

Ако $1 < a < 2$, то $(x; y) = (a - 1; 2 - a)$ или $(x; y) = (a - 2; 1 - a)$.


Ако $a = 2$, то x може да е всяко число в интервала $[0; 1]$ и $y = x - 1$.

В останалите случаи системата няма решение.

Задачата може да се реши и графично, като се съобрази, че множеството от точките в координатната система, които изпълняват първото уравнение, е квадрат с върхове $(1; 0)$, $(0; 1)$, $(-1; 0)$ и $(0; -1)$, а множеството от точките, които изпълняват второто – две прости съгълтови коефициенти 1 и -1 , минаващи през точката $(2a; 3)$.

Задача 2. Върху окръжност с център O са избрани точки A , B и C така, че мярката на дъгата \widehat{BC} е два пъти по-голяма от мярката на дъгата \widehat{AB} . Средите на отсечките OA , AB , BC и CO са съответно M , N , P и Q . Ако правите MP и NQ са перпендикуляри, да се намери мярката на $\angle ACB$.

Решение:



MN е средна отсечка в ΔAOB , а PQ е средна отсечка в ΔBCO . Следователно те са равни на половината от отсечката OB . Аналогично MQ и NP са равни на половината от отсечката AC . Така четириъгълникът $MQPN$ е успоредник и понеже диагоналите му са перпендикуляри по условие, то той е ромб. Оттук следва, че AC е равна на радиуса OB на окръжността и значи ΔACO е равностранен. Заключаваме, че малката дъга \widehat{AC} е равна на 60° . Възможни са няколко случая:

Случай 1. Точката B е върху малката дъга \widehat{AC} (вж. първия чертеж). Да означим $\widehat{AB} = x^\circ < 180^\circ$. Тогава $\widehat{BC} = 2x^\circ$ и $x^\circ + 2x^\circ = 60^\circ$, откъдето $x^\circ = 20^\circ$ и $\angle ACB = 10^\circ$.

Случай 2. Точката B е върху голямата дъга \widehat{AC} (вж. втория и третия чертеж). Сега, ако отново $\widehat{AB} = x^\circ < 180^\circ$, то са възможни два подслучая:

1. точката A е върху малката дъга \widehat{BC} ; условието на задачата може да се реализира, когато голямата дъга \widehat{BC} е два пъти по-голяма от малката дъга \widehat{AB} (вж. втория чертеж); тогава $2x^\circ = 360^\circ - x^\circ - 60^\circ$, откъдето $x^\circ = 100^\circ$ и $\angle ACB = 50^\circ$;
2. точката A е върху голямата дъга \widehat{BC} (вж. третия чертеж); единствената възможност е когато голямата дъга \widehat{BC} е два пъти по-голяма от малката дъга \widehat{AB} ; тогава $2x^\circ = 360^\circ - x^\circ + 60^\circ$, откъдето $x^\circ = 140^\circ$ и $\angle ACB = \frac{360^\circ - 140^\circ}{2} = 110^\circ$.

Да отбележим, че някои от комбинациите “малка-голяма дъга” не могат да се реализират поради ограниченията в условието на задачата.

Задача 3. Да се докаже, че ако положителните числа a, b, c, x, y и z изпълняват условията $a+b+c=x+y+z=1$, то

$$a) \frac{a^2}{a+x} + \frac{b^2}{b+y} + \frac{c^2}{c+z} = \frac{x^2}{a+x} + \frac{y^2}{b+y} + \frac{z^2}{c+z};$$

$$b) \frac{a^2}{a+x} + \frac{b^2}{b+y} + \frac{c^2}{c+z} \geq \frac{1}{2}. \text{ Кога се достига равенство?}$$

Решение: а)

$$\frac{a^2}{a+x} + \frac{b^2}{b+y} + \frac{c^2}{c+z} - \left(\frac{x^2}{a+x} + \frac{y^2}{b+y} + \frac{z^2}{c+z} \right) = \frac{a^2 - x^2}{a+x} + \frac{b^2 - y^2}{b+y} + \frac{c^2 - z^2}{c+z} =$$

$$= (a-x) + (b-y) + (c-z) = (a+b+c) - (x+y+z) = 1 - 1 = 0.$$

$$b) \text{ От а) следва, че } \frac{a^2}{a+x} + \frac{b^2}{b+y} + \frac{c^2}{c+z} = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2 + x^2}{a+x} + \frac{b^2 + y^2}{b+y} + \frac{c^2 + z^2}{c+z} \right) \text{ и}$$

като използваме, че $m^2 + n^2 \geq \frac{1}{2}(m+n)^2$, получаваме:

$$\frac{a^2}{a+x} + \frac{b^2}{b+y} + \frac{c^2}{c+z} \geq \frac{1}{4} \left(\frac{(a+x)^2}{a+x} + \frac{(b+y)^2}{b+y} + \frac{(c+z)^2}{c+z} \right) = \frac{1}{4} (a+x+b+y+c+z) = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}.$$

Тъй като в $m^2 + n^2 \geq \frac{1}{2}(m+n)^2$ равенство се достига при $m=n$, то равенство в даденото неравенство се достига при $a=x, b=y$ и $c=z$.

Забележка. Неравенството е директно следствие от “хубавото неравенство”:

$$\frac{a^2}{a+x} + \frac{b^2}{b+y} + \frac{c^2}{c+z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{a+x+b+y+c+z} = \frac{1}{2}.$$

Тук равенство се достига само ако $\frac{a}{a+x} = \frac{b}{b+y} = \frac{c}{c+z}$, което еквивалентно с $a=x, b=y$ и $c=z$.

Критерии за оценяване:

Задача 1. Общо 7 т., от които: по 1 т. за правилно разглеждане на всеки от 6-те случая: $a=-2$; $-2 < a < -1$; $a=-1$; $a=1$; $1 < a < 2$ и $a=2$. Седмата точка е за случаите, в които системата няма решение. При частично решение: по 1 т. за правилно разкриване на модула на всяко от уравненията. При решение без проверка дали решението принадлежи на дадения случай да се присъждат 30% от точките за този случай.

Задача 2. Общо 7 т., от които: 1 т. за откриване на поне две от средните отсечки; 1 т. за факта, че четириъгълникът $MQPN$ е ромб; 1 т. за факта, че ΔACO е равностранен; 3 т. за един от трите възможни случая за разположение на точките и общо 1 т. за останалите (точката се присъжда и за разглеждане на само един от останалите два случая).

Задача 3. Общо 7 т., от които: 2 т. за а) и 5 т. за б). В б) 1 т. за равенството $\frac{a^2}{a+x} + \frac{b^2}{b+y} + \frac{c^2}{c+z} = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2 + x^2}{a+x} + \frac{b^2 + y^2}{b+y} + \frac{c^2 + z^2}{c+z} \right)$, 1 т. за неравенството $m^2 + n^2 \geq \frac{1}{2}(m+n)^2$, 2 т. за завършване на задачата и 1 т. за случая на равенство, но при

отговор, че равенство се достига само ако всички числа са равни на $\frac{1}{3}$, точката не се присъжда. Прилагането на “хубавото неравенство” (еквивалентно, Коши-Шварц) без доказателство е допустимо.

Забележка. Посочените критерии са примерни и съответстват на предложените от Националната комисия решения. При наличие на алтернативни решения всяка Областна комисия изготвя свои критерии за оценяването им, като се съобразява с предложените.